

Vacuna meningocócica B

El meningococo es una bacteria que produce enfermedades graves: meningitis, sepsis, etc:

- La presencia de la infección tiene una mortalidad en torno al 10% y causa secuelas graves en el 20-30% de los supervivientes.
- En ocasiones tiene una evolución muy rápida que incluso con tratamiento antibiótico no se consigue frenar la infección.
- Hay varios tipos de meningococos, los más frecuente son: A,B,C,W e Y.

Meningococo A

No presente en nuestro país

Meningococo B

El más frecuente en nuestro país

Meningococo C

Incluida vacuna en el calendario oficial

Meningococo WY

Aumento importante en los últimos años en nuestro país.
Afecta principalmente en adolescentes, pero aumento progresivo en niños pequeños.

Nuestra recomendación

| Edad primera dosis | Inmunización primaria | | Dosis de refuerzo |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nº de dosis | Intervalo entre dosis | |
| 3 a 5 meses | 2 | No menos de 2 meses | Sí. Una dosis entre los 12 y 15 meses de edad (intervalo desde la segunda de la primovacunación: no menos de 6 meses) |
| 6 a 11 meses | 2 | No menos de 2 meses | Sí. Una dosis en el segundo año de vida (intervalo desde la segunda dosis de la primovacunación: no menos de 2 meses) |
| 12 a 23 meses | 2 | No menos de 2 meses | Sí. Una dosis con un intervalo de 12 a 23 meses desde la segunda dosis de la primovacunación |
| 2-14 años | 2 | No menos de 1 mes | No se ha establecido. |

Nombres comerciales

Bexsero: Desde los 3 meses

Trumenba: Desde los 10 años (2 dosis separadas 6 meses)

Ejemplo de vacunación

Administrar a los 3-5 y 13 meses

Administrar a los 6-8 y 16 meses

Administración por vía intramuscular

Se recomienda administrar de forma aislada para disminuir reacciones adversas.

Reacciones adversas

Con premedicación con paracetamol se ha disminuido su intensidad sobretodo en menores de 12 meses.