

Vacuna rotavirus

El rotavirus es un virus que produce gastroenteritis:

- Supone entre el 15-30% de todas las gastroenteritis agudas.
- Principal causa de ingreso hospitalario por diarrea en la etapa infantil.
- Los menores de 2 años son los que tienen más riesgo de sufrir complicaciones.
- A los 2 años prácticamente todos los niños han sufrido una gastroenteritis por rotavirus.

Administración

Via oral. Puede administrarse conjuntamente con le resto de vacunas

Dosis

Primera dosis entre 6 y 12 semanas de vida

Intervalo mínimo entre dosis 1 mes

Recomendamos administrar conjuntamente con vacunas del calendario vacunal.

Nuestra recomendación

Vacuna	Edad	Dosis
Rotarix	2 meses	1ª dosis
	4 meses	2º dosis
Rotateq	2 meses	1ª dosis
	4 meses	2º dosis
	6 meses	3ª dosis

Nombres comerciales

Rotarix: 2 dosis

Rotateq: 3 dosis

Fecha límite última dosis

Rotarix: 24 semanas

Rotateq: 32 semanas

Contraindicaciones:

- Invaginación intestinal previa
- Malformaciones digestivas que predisponen a una investigación intestinal

Reacciones adversas

Poco frecuentes, si aparecen son diarrea, vómitos y fiebre moderada