

Vacuna Meningocócica ACWY

El meningococo es una bacteria que produce enfermedades graves: Meningitis, sepsis, etc:

- La presencia de la infección tiene una mortalidad en torno al 10% y causa secuelas graves en el 20-30% de los supervivientes.
- En ocasiones tiene una evolución muy rápida que incluso con tratamiento antibiótico no se consigue frenar la infección.
- Hay varios tipos de meningococos, los más frecuente son: A,B,C,W e Y.

Meningococo A

No presente en nuestro país

Meningococo B

El más frecuente en nuestro país

Meningococo C

Incluida vacuna en el calendario oficial

Meningococo WY

Aumento importante en los últimos años en nuestro país.
Afecta principalmente en adolescentes, pero aumento progresivo en niños pequeños.

Vacunación oficial Comunidad Valenciana

Dosis de Meningococo C (NeisVac): 4 y 12 meses

Dosis de Meningococo ACWY: 12 años

Además en 2021 se están vacunando los nacidos en 2005-2006

Nuestra recomendación

En menores de 12 meses:

Dosis de Meningococo C (NeisVac): 4 meses

Dosis de Meningococo ACWY: a los 12 meses y a los 12 años

Entre 12 meses y 10 años: 1 dosis de ACWY y recuerdo a los 12 años

Mayores de 10 años: Una dosis única de ACWY o esperar a los 12 años

Existe la posibilidad de inmunizar con esta vacuna en menores de 1 año, con una valoración individualizada. Las pautas son las siguientes:

Pauta iniciada a los 2 meses:

Dosis Meningococo ACWY: 2-4-12 meses y a los 12 años

Pauta iniciada a los 6 meses:

Dosis de meningococo C (NeisVac): 4 meses

Dosis de Meningococo ACWY: 6 meses-12 meses y a los 12 años

Recomendación especial

Niños a partir de 6 semanas de vida que viajen/residan a zonas con elevado número de casos o donde se encuentre la vacunación en calendario.

Administración por vía intramuscular

Se puede administrar a la vez que la mayoría de vacunas

Nombres comerciales

Nimenrix: Desde las 6 semanas **Menveo:** Desde los 2 años